

Olbern olwer

Vass8R09s131-135



Collection Vassal-Montpellier

1601Mtp2

Cl 8 R 9 s 131-135  
Olbern olwer

Olbern olwer

8 R 9 s. 131-135  
⊕

Olbern olwer

Vass8R09s131-135



Collection Vassal-Montpellier


1601Mtp2

Cl 8 R 9 s 131-135  
Olbern olwer


olbern olwer

8 R 9 s - 131-135  
⊕














SUS 8 RANG 9 Souche 131-135

Désignation : *Colbern oliver 160102*

Source :

Année :

Végetation :

28.7

Maturité :

5.9.88

X  
+3

Mill.: 0

Pour.: 0

Forme : G - M - P - Dim.: 13

L - M - C

Vitesse : 2

Forme : érig - 1/2 érig - couché

Forme :

Année :

TG - G - M - P - Dim.: 17

Forme : sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

Forme : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Forme : s - m - ar - fox - herb.

s1 1

Avec pépins - apyrène

s2 3

JUS : inc. - coloré

s3 2

s4 2

s5 1



ANNEE 1987

FROM Olbern Ober

### EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R9 A 131. 135

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin	Véraison début mi/v fin	Maturité
1	2f	23.3	21.3	2	4.0 10.6 14.6		
2	5	21.3	7.4	2	4.6 10.6 14.6		
3	5	27.3	21.3	4	4.6 10.6 14.6	27.7 30.7 3.8	14.9
4	4	27.3	21.3	2	3.6 10.6 14.6	+1	+4
5	3	27.3	21.3	2	3.6 10.6 14.6		
	19	2.4	12	6	10.6	Port enge'	
		+6			+3	Vigneuse 2	

ANNEE

ANNEE 1988

NOM

NOM Olbern Oliver bl

## EMPLACEMENT

EMPLACEMENT 8 R9 131. 135

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2	5	28.3	1.4	3								
3	3	<del>28.3</del>	28.3	2	5	31.5	3.6	6.6	28.7	1.8	4.8	5-9.88
4	4	28.3	1.4	2								
5 f												
			30.3				3.6					
			+6				+3			+2		+3
Pourriture : 0      Port : couche'      Vigueur : 2 faible												

ANNEE 1989

NOM Gelber Ananas B  
160102

EMPLACEMENT 8 Rg 131-135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2	4	16.3	20.3	9		24.5						
3	4	16.3	20.3	4	13	24.5	27.5	30.5	24.7	31.7	7.8	28.8
4	4	16.3	20.3	3		24.5						
5 f												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : rouge

Vigueur : 3

16.3 20.3 + 2



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

albera oliver

cl 8 R 9 s 131-135 (s. 132)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -  
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité  
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -  
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé  
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -  
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité  
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -  
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -  
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -  
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -  
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -  
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -  
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -  
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou  
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -  
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans  
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Olbern oliver  
8 R 9 1-131-135 (A. 132)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -  
sêteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 248 - cotonneux 241.  
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.  
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.  
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Olbern olwer

8 R 9 s. 131-135 (s. 132)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - <sup>très légt</sup> sèteux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sèteux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sèteux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 <sup>légt</sup> sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : <sup>cou</sup> plan - en gouttière - involuté - révoluté - <sup>légt</sup> tourmenté.

Lobes : <sup>cou</sup> plan - en gouttière - involuté - <sup>tendance à légt</sup> révoluté - <sup>légt</sup> tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 <sup>légt</sup> entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 <sup>cou</sup> - court 172.

Glabre 173 - sèteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Olbern olver

8 Rgs- 131-135 s.(132)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - parfois lig. - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoté 78 - aoté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 17 x 17).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86



DENOMINATION : *Olbern olver*  
EMPLACEMENT : *8 R 9 A 131-135 (4.2)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>10</sup>..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). -  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 86*



N° d'ordre :

Désignation : *Olbern olver*

Emplacement : *8R9S 131-135*

Angle des nervures : 1 - ② - ③  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : ⑦ - 8 - 9  
L<sub>2</sub>/L : ⑩ - ⑪  
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ⑳ - ㉓ - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚  
Sinus pétiolaire ouvert : ㉛  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ㉝ - ㉞ - 37 - ㉟ - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉚ - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉛  
Dents : forme : ㉜ - ㉝  
Dents (angle) : ㉞ - ㉟ - 44  
Angle du lobe terminal : ㊱ - ㊲ - ㊳  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊴ - 50  
Nb. dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - 53 - ㊵ - ㊶ - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ㊷ - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊸ - 66 - ㊹

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües